



Брюссель и Вильнюс, 31 августа, 2010 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

День осведомленности о передозировках: Общественные организации призывают расширить доступ к налоксону в целях предотвращения тысяч бессмысленных смертей

Каждый год тысячи человек в странах Европы и Центральной Азии лишаются жизни в связи с передозировками наркотиков. Применение налоксона - безопасного и высокоэффективного средства против передозировок опиоидов - людьми, употребляющими наркотики, могло бы предотвратить тысячи бессмысленных смертей. В Международный день осведомленности о передозировках организации на базе сообществ призывают Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ) и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) включить рекомендации по применению налоксона в их руководства и призвать органы здравоохранения расширить доступ к программам с использованием налоксона.

Передозировки являются важным вопросом общественного здравоохранения. Во многих странах они являются ведущей причиной смертности, унося почти столько же жизней, сколько и автомобильные аварии. С 1995 года в странах Европейского Союза каждый год регистрируется от 6300 до 8200 передозировок со смертельным исходом. Несмотря на отсутствие полной информации о ситуации со смертностью от передозировок в странах, расположенных к востоку от ЕС, скорее всего, эта ситуация выглядит еще хуже, поскольку в этих странах гораздо больше людей употребляют опиаты инъекционным путем, а доступ к программам значительно хуже. Только в России каждый год регистрируется более 9000ⁱ смертных случаев от передозировок. Предположительно, реальное число передозировок со смертельным исходом значительно выше, чем официально зарегистрированное.

Налоксон - недорогое, безопасное, ненаркотическое и высокоэффективное лекарственное средство, не вызывающее зависимости, которое блокирует передозировку опиоидами в течение 1 - 5 минут после его применения. Налоксон включен в Перечень основных лекарственных средств Всемирной Организации Здравоохранения и зачастую используется в больницах и на станциях скорой помощи. Ряд инновационных программ занимается распространением налоксона среди потребителей наркотиков, их друзей и членов их семей, а также обучает их правилам применения этого лекарства. Результаты исследований демонстрируют, что при наличии соответствующего обучения люди, употребляющие наркотики, могут не хуже медицинских специалистов распознавать признаки передозировок и определять необходимость применения налоксона.ⁱⁱ

Программы профилактики передозировок с использованием налоксона начались в Великобритании, Германии и Соединенных Штатах Америки в середине 1990-х годов; сегодня эти программы являются повседневной практикой более чем в 15 странах и демонстрируют потрясающие результаты. Например, существование

чикагской программы совпало с 30-процентным снижением смертности, связанной с передозировками, в течение трех лет после начала программы.ⁱⁱⁱ Подобные результаты зарегистрированы и в других городах.

Появляется больше возможностей: только на прошлой неделе, в Европе, правительство Шотландии объявило о расширении программ применения налоксона на всю территорию страны. Успешные пилотные программы появились в разных странах Европы и Центральной Азии, включая Италию, Португалию, Таджикистан, Казахстан, Россию, Украину, Великобританию, Грузию, Германию и Испанию.

По всему миру программы снижения вреда, многие из которых изначально были организованы в целях профилактики передачи ВИЧ, также предоставляют налоксон непосредственно потребителям наркотиков в рамках основных оказываемых им услуг. Передозировки зачастую становятся ведущей причиной смертности людей, живущих с ВИЧ, употребляющих опиаты — эта проблема существует в Соединенных Штатах, России и других странах. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией недавно выступил с заявлением^{iv} о финансировании программ предоставления налоксона; аналогичное заявление было сделано представителями Президентского чрезвычайного плана борьбы со СПИДом (ПЕПФАР).^v “Учитывая, что передозировки являются ведущей причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ и употребляющих наркотики, мы должны заниматься адвокацией программ противодействия передозировкам в рамках комплексного набора услуг по профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции”, заявила Анна Жакович из Европейской группы по лечению СПИДа (EATG). Как подчеркивается в недавней публикации “Значимость передозировок при ВИЧ”, выпущенной Евразийской сетью снижения вреда (ЕССВ) и Институтом открытое общество (ИОО), распространение налоксона позволяет повысить качество программ по ВИЧ-инфекции, привлечь большее число клиентов в программы и способствовать раскрытию потенциала сообществ.^{vi}

По-прежнему существуют барьеры к расширению программ распространения налоксона: несмотря на то, что налоксон не является наркотиком или веществом, оборот которого ограничен, во многих странах его продажа до сих пор осуществляется лишь по рецепту, а использование налоксона не включено в ключевые руководства ВОЗ или УНП ООН. Организации на основе сообществ, во главе с ЕССВ и EATG, призывают агентства ООН и власти стран незамедлительно внедрить и расширить применение налоксона в рамках низкопороговых программ. “Это одна из тех редких ситуаций в общественном здравоохранении, когда сравнительно недорогой и простой метод может сохранить тысячи жизней. Я надеюсь, что через несколько лет распространение налоксона среди потребителей наркотиков станет обычной практикой”, подчеркнула Шона Шонинг, директор программ ЕССВ.

Ссылки:

Значимость передозировок при ВИЧ. ЕССВ и ИОО 2010

На английском языке: http://www.harm-reduction.org/images/stories/library/why_overdose_prevention_matters_for_hiv.pdf

На русском языке: http://www.harm-reduction.org/ru/images/stories/library/od_hiv_ru.pdf

Статистический бюллетень EMCDDA по смертности в связи с употреблением наркотиков. Июль 2010

На английском языке: <http://www.emcdda.europa.eu/stats10/drd>

Передозировка: ведущая причина смертности среди ПИН и ЛЖВ в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии. Рекомендации и обзор ситуации в Латвии, Кыргызстане, Румынии, России и Таджикистане; ЕССВ 2008

На русском языке: http://www.harm-reduction.org/images/stories/library/od_report_2008_ru.pdf

На английском языке: http://www.harm-reduction.org/images/stories/library/od_report_2008_en.pdf

Коллекция 50 лучших публикаций по проблеме передозировок Международной ассоциации снижения вреда, МАСВ 2009

На английском языке: <http://www.ihra.net/Overdose>

Сохраняем жизнь при помощи налоксона: глобальные новости о программах противодействия передозировкам

На русском языке: www.harm-reduction.org/images/stories/library/overdose_awareness_day_update_ru.pdf

На английском языке: www.harm-reduction.org/images/stories/library/overdose_awareness_day_update.pdf

Информационный бюллетень Глобального фонда «Снижение вреда», ГФСТМ 2010

На русском языке:
http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_InfoNote_HarmReduction_ru.pdf

На английском языке:
http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_InfoNote_HarmReduction_en.pdf

Комплексная профилактика по профилактике ВИЧ для потребителей инъекционных наркотиков, Рекомендации - пересмотренный вариант 2010; Чрезвычайный план Президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR).

На английском языке: <http://www.pepfar.gov/documents/organization/144970.pdf>

День осведомленности о передозировках, Армия спасения (Австралия)

На английском языке:
http://www.salvationarmy.org.au/SALV/LANDING/PC_60908.html

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к:

Г-же Шоне Шоннинг, Програмный директор ЕССВ, +370 685 51553, shona.schonning@gmail.com (английский, русский языки)

Г-же Анне Жакович, Председатель EATG, +370 606 57136, anna.zakowicz@eatg.org (английский, русский языки)

О Европейской группе по лечению СПИДа:

Европейская группа по лечению СПИДа (ЕАТГ) – это НПО, находящееся на переднем крае развития потенциала гражданского общества по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа в Европе. С 1991 года ЕАТГ является европейской организацией по адвокации; деятельность организации направляется людьми, живущими с ВИЧ. ЕАТГ представляет и защищает интересы людей, живущих с ВИЧ и СПИДом, связанные с лечением. Ее миссия состоит в обеспечении в кратчайший срок доступа к высокотехнологичным медицинским продуктам, приборам и диагностическим тестам для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и для повышения качества жизни ВИЧ-положительных людей и тех, кто находится в ситуации риска по ВИЧ-инфекции. Дополнительную информацию можно найти по адресу: www.eatg.org

О Евразийской сети снижения вреда:

Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) – региональная сеть, миссия которой заключается в продвижении гуманных, научно обоснованных подходов снижения вреда от употребления наркотиков с целью сохранения и поддержания здоровья и обеспечения защиты прав человека на уровне индивидуума, сообщества и населения в целом. Сегодня ЕССВ объединяет более 300 индивидуальных лиц и организаций из 29 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. Дополнительную информацию можно найти по адресу: www.harm-reduction.org

ⁱ (Кошкина 2008) Кошкина, Е. А., “Смертность в связи с употреблением наркотиков”. Презентация в ходе “Использование эпидемиологических методов для исследования смертности среди потребителей наркотиков”. Петрозаводск, Россия, 2008.

ⁱⁱ (Green 2009) Green TC, Heimer R, Grau LE. 2008. “Distinguishing signs of opioid overdose and indication for naloxone: an evaluation of 38. six overdose training and naloxone distribution programs in the United States.” *Addiction*, Vol. 103, No. 6: 979-989.

ⁱⁱⁱ (Maxwell 2006) Maxwell S, et al. 2006. 12. *J Addict Dis* 25(3):8996.

^{iv} Снижение вреда. Информационный бюллетень. GFATM 2010
http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_InfoNote_HarmReduction_ru.pdf

^v Comprehensive HIV Prevention for People Who Inject Drugs, Revised Guidance 2010, The U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) <http://www.pepfar.gov/documents/organization/144970.pdf>

^{vi} (ЕССВ 2010) Значимость передозировок при ВИЧ. Евразийская сеть снижения вреда и Институт открытое общество, 2010